

## cassino com dep#243;sito m#237;nimo de

<div>

<h3>cassino com dep#243;sito m#237;nimo de 1 real</h3>

<p>O sertaconazole #233; um agente antif#250;ngico efetivo que auxilia a

combater doen#231;as f#250;ngicas na pele e mucosas, como candid#237;ase cut

#226;nea, genital e oral, e p#233; de atleta.</p>

<p>A atividade antif#250;ngica do sertaconazole ocorre atrav#233;s da in

ibi#231;#227;o da bioss#237;ntese de ergosterol e a interrup#231;#227;o da

parede celular. Esse medicamento #233; frequentemente utilizadocassino com dep&

#243;sito m#237;nimo de 1 realcassino com dep#243;sito m#237;nimo de 1 real p

#243;, o que facilita acassino com dep#243;sito m#237;nimo de 1 realaplica#2

31;#227;ocassino com dep#243;sito m#237;nimo de 1 realcassino com dep#243;si

to m#237;nimo de 1 real diferentes #225;reas do corpo.</p>

<h4>Aplica#231;#227;o e efic#225;cia do sertaconazole</h4>

<p>De acordo com um estudo cl#237;nico, no final do tratamento, uma porce

ntagem maior de pacientes no grupo que usou sertaconazole teve melhoria dos sint

omas de eritema, prurito, descama#231;#227;o da pele e ves#237;culascassino c

om dep#243;sito m#237;nimo de 1 realcassino com dep#243;sito m#237;nimo de 1

real compara#231;#227;o com o grupo que tomou luliconazol.</p>

<table border="1">

<thead>

<tr>

<th>% de melhoria</th>

<th>Sintoma</th>

<th>Sertaconazole</th>

<th>Luliconazol</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>86,66%</td>

<td>Eritema</td>

<td>86,66%</td>

<td>48,27%</td>

</tr>

<tr>

<td>90%</td>

<td>Prurito</td>

<td>90%</td>

<td>75,86%</td>

</tr>

<tr>

<td>96,66%</td>

<td>Descama#231;#227;o da pele</td>

<td>96,66%</td>

<td>86,20%</td>

</tr>

<tr>

<td>96,66%</td>

<td>Ves#237;culas</td>

<td>96,66%</td>

<td>89,65%</td>